

Despre boli: simptome și tratamente

Vă rugăm contactați medicul dacă prezentați unul dintre simptomele descrise în continuare.



Boala Lyme (borrelioza) se manifestă prin următoarele simptome care apar de obicei în 3-4 zile de la momentul muncării:

- erupție cutanată roșie, de formă circulară, în jurul mușcăturii;
- simptome asemănătoare celor de gripă, de exemplu, febră, oboseală și dureri de cap.



Cele mai multe cazuri de borelioză pot fi tratate, prin administrare de antibiotice timp de câteva săptămâni. Netratată, însă, boala poate provoca infecții ale inimii, articulațiilor și sistemului nervos.



Febra recurentă se caracterizează prin următoarele simptome care apar de obicei în 4-5 săptămâni de la momentul mușcăturii:

- episoade repetate de febră adesea însoțite de dureri de cap, dureri musculare și de articulații și greață.

Numărul episoadelor de febră este foarte variabil, iar intervalele dintre ele este cuprins între 4 și 14 zile. Tratamentul recomandat pentru febra recurentă transmisă de căpușe este administrarea de tetraciclină sau doxiciclină. Căpușele de deces sunt foarte rare.



Infecția de căpușe este asociată următoarelor simptome care, de obicei, apar în 4 săptămâni de la momentul mușcăturii:

- febră, oboseală, dureri de cap, dureri musculare și greață.


Faza avansată a bolii implică sistemul nervos, cu simptome similare celor de meningită, și necesită spitalizare. În prezent, nu există niciun tratament pentru cefaleea de căpușe. Deși cazurile de deces sunt rare, există un risc considerabil de efecte neurologice de lungă durată. Vaccinarea prealabilă și luarea măsurilor de protecție împotriva mușcăturilor de căpușe sunt extrem de importante atunci când vizitați o regiune endemică.




Febra hemoragică Crimeea-Congo se manifestă prin următoarele simptome (simptomele încep să apară în 3-5 zile de la momentul mușcăturii):

- febră, dureri musculare, ameteală;
- dureri abdominale și varsături;
- sângerări.

În prezent, nu există niciun tratament pentru febra hemoragică Crimeea-Congo, care poate fi mortală. Prin urmare, este extrem de important să luați măsuri preventive când vizitați regiuni endemice.



Informații despre bolile transmise de căpușe



Căpușele pot transmite boli grave




Căpușele pot transmite boli grave

Căpușele sunt foarte mici și se hrănesc cu sânge de mamifer, reptile și păsări, de la care pot lua bacterii sau virusuri.

Căpușele pot mușca și oamenii care trec prin mediul lor de viață.

Cu toate că mușcătura de căpușe nu este, în sine, periculoasă, există riscul ca acestea să transmită infecții în sânge atunci când se hrănesc și să provoace boli grave.



Unele căpușe pot transmite boli grave, în funcție de specia de căpușe.

În Europa, bolile transmise de căpușe la oameni sunt:

- encefalita de căpușe
- boala Lyme (borrelioza)
- febra recurentă
- febra hemoragică Crimeea-Congo

Accese boli apar în regiuni diferite unde există căpușe infectate care pot transmite boala.

